

# FOPAZ



## Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 90,4 g/l (7,3%)

folpet (substancja z grupy imidów) – 484 g/l (39,1%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 140/2021 z dnia 03.11.2021 r.

 	
<b>Uwaga</b>	
H351	Podrażnia skórę, może powodować raka.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH208	Zawiera folpet (133-07-3), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P201	Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280	Stosować ochronę oczu, odzież ochronną, rękawice ochronne.
P308 + P313	W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady lekarskiej.
P391	Zebrać wyciek

## OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej (SC) o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi organizmami grzybobodobne.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy 11, a substancja czynna folpet do grupy M4.

## STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego.

### Winorośl

*mączniak rzekomy winorośli*

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha (1,57 l/ 10 000 m<sup>2</sup> LWA – ściany liści).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 - 2,0 l/ha (1,24 – 1,57 l/ 10 000 m<sup>2</sup> LWA – ściany liści).

Termin stosowania środka: środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do końca fazy rozwoju owoców – zamykanie gron (BBCH 50-79).

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Zalecana ilość wody: 800-1200 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3